

Perkara yang perlu diketahui sebelum dan selepas berkhatan

Oleh HALINA MD. NOR

MUSLIM ramai yang berkhatan sebelum berkahwin. Biasanya, berkhatan dilakukan oleh ibu bapa untuk membolehkan anak lelaki mereka menjalani prosedur berkhatan atau berkhatan di klinik atau hospital.

Pada masa ini, ramai kaum-kaum yang tidak dikhatkan dapat dilihat. Ada yang memang dan mawaddu'nya sendiri memotong apabila tiba giliran untuk masuk ke bilik berkhatan. Ada juga sempat melihat dan berkahwin.

Pakar Bedah Urologi Islam Antarabangsa Malaysia dan Setiausaha Ageng I-Medical Trust, Dr. Muhammad Irfan bin Muhammad Irfan berkata, biasanya ibu bapa memotong beberapa perkara sebelum memutuskan untuk mengkhitankan anak.

"Bagi ibu bapa, pastikan anak-anak tersebut secara mental untuk menjalani prosedur berkhatan. Elakkan memaksa anak kerana itu akan memberi trauma yang mendalam kepada mereka dan akan berakibat kepada komplikasi."

"Ibu bapa juga perlu mengetahui beberapa langkah sebagai persiapan mental anak yang akan berkhatan. Pastikan anak bersedia dan bersedia untuk berkhatan."

menunjukkan ketajaman peris beberapa hari sebelum berkhatan," katanya. Katanya lagi, persiapan itu bagi mengurangkan risiko phimosia atau kecacatan pada uretra seperti hipospadias yang mana memerlukan rawatan di hospital oleh pakar.

Phimosia atau biasanya disebut liput futa adalah kecacatan lain pada saluran kencing (sekitar) seperti hipospadias atau bukan memotong futa diujung ketajaman kemaluan tetapi di bahagian bawah ketajaman kemaluan.

Semua kecacatan atau abnormaliti ini memerlukan rawatan pakar untuk merawat dan mengurangkan prosedur berkhatan.

KELETERIAN BERSUNAT
Bagi Muslim, sunnah berkhatan termasuk dalam hukum wajib. Berkhatan adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan.



DR. MUHAMMAD IRFAN
MUHAMMAD SALMI

Dr. Muhammad Irfan berkata, jika dilihat kelihatan berkhatan daripada sudut kesihatan, sekiranya sudah semestinya berkhatan kerana ia akan mengurangkan risiko jangkitan kencing adalah etam kali ganda lebih tinggi bagi mereka yang tidak

berkhatan berbanding mereka yang berkhatan bagi mereka yang berkhatan i hingga ke tahun.

"Berkhatan boleh dilakukan seawal bayi baru dilahirkan sehingga usia sebelum setahun. Ada juga prosedur yang dilakukan kepada orang dewasa di bahagian ini kesihatan, penegetahan jangkitan atau kesan berkhatan agama," katanya.

"Terdapat prosedur untuk membolehkan seseorang kaum-kaum menjalani prosedur berkhatan ini. Amalan di negara Islam lain seperti Arab Saudi dan Kuwait, prosedur tersebut dilakukan ke atas bayi yang baru lahir sebelum dibesarkan pulang ke rumah.

Sama ada prosedur ini tidak dilakukan di hospital-hospital kerajaan di Malaysia tetapi ditawarkan di beberapa hospital swasta. Katanya, prosedur suntik kaun-kaun, kebanyakannya dilakukan oleh pegawai perubatan yang terlatih. Ada juga yang dibuat oleh pembantu pegawai perubatan (AMU) sementara dalam program suntik berskala besar dan memerlukan suntik tek median.

KOMPLIKASI

Dr. Muhammad Irfan berkata, komplikasi yang paling kerap berlaku selepas berkhatan adalah peradangan. Ia boleh berlaku ketika prosedur dijalankan atau dalam tempoh zajam.

"Peradangan berlaku selepas beberapa hari biasanya disebabkan jangkitan. Selain itu, komplikasi yang biasa adalah jangkitan di kawasan perubatan. Walaupun jarang, namun ada kes-kes yang berlaku yang disebabkan oleh jangkitan yang disebabkan oleh prosedur berkhatan."

Terdapat komplikasi lain yang boleh berlaku pada prosedur berkhatan. Contohnya, komplikasi yang boleh berlaku adalah berdarah. Biasanya, berdarah berlaku pada prosedur berkhatan kerana prosedur berkhatan memerlukan suntikan. Biasanya, berdarah berlaku kerana prosedur berkhatan memerlukan suntikan. Biasanya, berdarah berlaku kerana prosedur berkhatan memerlukan suntikan."

pembedahan. Kain sarung yang dipakai kaum-kaum itu juga kelihatan kotor bercah dengan darah.

Sekiranya berlaku jangkitan, ia dapat dilihat daripada kerosakan yang tidak bersih, adanya kelenjar (abscess) yang keluar dari sekitar kemaluan yang menjadi merah. Bagi lelaki yang tidak berkhatan, kelenjar peris kemaluan akan dilihat merah terutamanya kerana terutamanya dengan kelenjar peris kemaluan.

BAWAKAN KOMPLIKASI

Prosedur berkhatan biasanya dilakukan oleh tok median terlatih. Perkhitanan perlu dibenarkan awal sebelum khat dilakukan. Ada beberapa tempat yang biasa berlaku perkhitanan biasanya dilakukan dengan teliti.

"Langkah awal adalah memeriksa kawasan yang berkhatan. Jika prosedur berkhatan masih berterusan, maka jangkitan perlu diteliti semula. Kawasan yang berdarah boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik atau dengan menggunakan antibiotik. Biasanya, berdarah berlaku kerana prosedur berkhatan memerlukan suntikan."

"Jika jangkitan berlaku, pada beberapa tablet antibiotik dan rawatan lain sudah mencukupi untuk merawatnya. Jarang sekali kaum-kaum terkhitan perlu dimasukkan ke dalam waduk dan antibiotik intravena untuk merawat di bawah khat diperlukan," katanya.

Menurutnya, komplikasi yang boleh berlaku adalah berdarah. Biasanya, berdarah berlaku kerana prosedur berkhatan memerlukan suntikan. Biasanya, berdarah berlaku kerana prosedur berkhatan memerlukan suntikan."

"Komplikasi lain adalah khat yang dipotong terlalu banyak yang mana boleh menyebabkan kesakitan apabila ereksi berlaku pada prosedur berkhatan. Biasanya, berdarah berlaku kerana prosedur berkhatan memerlukan suntikan. Biasanya, berdarah berlaku kerana prosedur berkhatan memerlukan suntikan."

